

各位

モサプリドクエン酸塩錠 2.5mg/5mg「日医工」  
モサプリドクエン酸塩散 1%「日医工」  
モサプリドクエン酸塩錠 2.5mg/5mg「EE」  
経口腸管洗浄剤によるバリウム注腸 X線造影検査前処置の補助に対する  
効能・効果および用法・用量追加のお知らせ

当社ならびに当社の子会社であるエルメッド株式会社（本社：富山県富山市総曲輪一丁目6番21）は、モサプリドクエン酸塩錠 2.5mg/5mg「日医工」、モサプリドクエン酸塩散 1%「日医工」およびモサプリドクエン酸塩錠 2.5mg/5mg「EE」につきまして、本日9月30日、下記の通り、経口腸管洗浄剤によるバリウム注腸 X線造影検査前処置の補助に対する「効能・効果」および「用法・用量」の追加に係る承認を取得いたしましたのでお知らせいたします。

これにより、先発医薬品と「効能・効果」および「用法・用量」が同一となります。

ジェネリック医薬品の普及のため、先発医薬品との「効能・効果」および「用法・用量」の違いを早期に解消し、患者様や医療関係者の皆様が安心してご使用いただけるよう取り組んでまいります。

## 記

## 【効能・効果】（下線部追加）

- 慢性胃炎に伴う消化器症状（胸やけ、悪心・嘔吐）
- 経口腸管洗浄剤によるバリウム注腸 X線造影検査前処置の補助

## 【用法・用量】（下線部追加）

- 慢性胃炎に伴う消化器症状（胸やけ、悪心・嘔吐）  
通常、成人には、モサプリドクエン酸塩として1日15mgを3回に分けて食前または食後に経口投与する。
- 経口腸管洗浄剤によるバリウム注腸 X線造影検査前処置の補助  
通常、成人には、経口腸管洗浄剤の投与開始時にモサプリドクエン酸塩として20mgを経口腸管洗浄剤（約180mL）で経口投与する。また、経口腸管洗浄剤投与終了後、モサプリドクエン酸塩として20mgを少量の水で経口投与する。

以上

問い合わせ先  
日医工株式会社 社長室 コーポレート・コミュニケーション部  
Tel 076-442-7026