

各 位

グラニセトロン静注液 1mg/3mg 「日医工」

グラニセトロン点滴静注液 3mg バッグ 「日医工」

術後の消化器症状（悪心、嘔吐）に対する効能又は効果、用法及び用量追加のお知らせ

日医工株式会社は、グラニセトロン静注液 1mg/3mg 「日医工」、グラニセトロン点滴静注液 3mg バッグ 「日医工」につきまして、本日 7 月 27 日、下記の通り、術後の消化器症状（悪心、嘔吐）に対する「効能又は効果」、「用法及び用量」の追加に係る承認を取得いたしましたのでお知らせいたします。

これにより、先発医薬品と「効能又は効果」、「用法及び用量」が同一となります。

ジェネリック医薬品の普及のため、先発医薬品との「効能又は効果」、「用法及び用量」の違いを早期に解消し、患者様や医療関係者の皆様が安心してご使用いただけるよう取り組んでまいります。

## 記

## 【効能又は効果】（下線部追加）

○抗悪性腫瘍剤（シスプラチン等）投与及び放射線照射に伴う消化器症状（悪心、嘔吐）

○術後の消化器症状（悪心、嘔吐）

## 【用法及び用量】（下線部追加）

<抗悪性腫瘍剤（シスプラチン等）投与に伴う消化器症状（悪心、嘔吐）>  
（略）

<放射線照射に伴う消化器症状（悪心、嘔吐）>  
（略）

<術後の消化器症状（悪心、嘔吐）>

通常、成人にはグラニセトロンとして 1 回 1mg を静注又は点滴静注する。

なお、年齢、症状により適宜増減する。ただし、1 日 3mg までとする。

以 上

問い合わせ先

日医工株式会社 社長室 コーポレート・コミュニケーション部

TEL 076-442-7026