

各 位

ピタバスタチン Ca 錠 1mg/2mg 「EE」
小児の家族性高コレステロール血症に対する用法・用量の追加のお知らせ

当社の子会社であるエルメッド株式会社（本社：富山県富山市総曲輪一丁目6番21）は、ピタバスタチン Ca 錠 1mg/2mg 「EE」につきまして、本日11月27日、下記の通り、小児の家族性高コレステロール血症に対する「用法・用量」の追加に係る承認を取得いたしましたのでお知らせいたします。

これにより、先発医薬品と「効能・効果」および「用法・用量」が同一となります。

ジェネリック医薬品の普及のため、先発医薬品との「効能・効果」および「用法・用量」の違いを早期に解消し、患者様や医療関係者の皆様が安心してご使用いただけるよう取り組んでまいります。

記

【用法・用量】（下線部追加）

高コレステロール血症

通常、成人にはピタバスタチンカルシウムとして1～2mgを1日1回経口投与する。
なお、年齢、症状により適宜増減し、LDL-コレステロール値の低下が不十分な場合には増量できるが、最大投与量は1日4mgまでとする。

家族性高コレステロール血症

成人：通常、成人にはピタバスタチンカルシウムとして1～2mgを1日1回経口投与する。

なお、年齢、症状により適宜増減し、LDL-コレステロール値の低下が不十分な場合には増量できるが、最大投与量は1日4mgまでとする。

小児：通常、10歳以上の小児にはピタバスタチンカルシウムとして1mgを1日1回経口投与する。

なお、症状により適宜増減し、LDL-コレステロール値の低下が不十分な場合には増量できるが、最大投与量は1日2mgまでとする。

以 上

問い合わせ先

日医工株式会社 社長室 コーポレート・コミュニケーション部
Tel 076-442-7026