

2021年12月1日

各 位

フルボキサミンマレイン酸塩錠 25mg/50mg/75mg 「EMEC」
小児の強迫性障害に対する用法及び用量追加のお知らせ

当社の子会社であるエルメッド株式会社（本社：富山県富山市）は、フルボキサミンマレイン酸塩錠 25mg/50mg/75mg 「EMEC」につきまして、本日12月1日、下記の通り、小児の強迫性障害に対する「用法及び用量」の追加に係る承認を取得いたしましたのでお知らせいたします。

これにより、先発医薬品と「効能又は効果」、「用法及び用量」が同一となります。

ジェネリック医薬品の普及のため、先発医薬品との「効能又は効果」、「用法及び用量」の違いを早期に解消し、患者様や医療関係者の皆様が安心してご使用いただけるよう取り組んでまいります。

記

【用法及び用量】（下線部追加）

成人への投与：

<うつ病・うつ状態、強迫性障害、社会不安障害>

通常、成人には、フルボキサミンマレイン酸塩として、1日 50mg を初期用量とし、1日 150mg まで増量し、1日 2回に分割して経口投与する。なお、年齢・症状に応じて適宜増減する。

小児への投与：

<強迫性障害>

通常、8歳以上の小児には、フルボキサミンマレイン酸塩として、1日1回 25mg の就寝前経口投与から開始する。その後1週間以上の間隔をあけて1日 50mg を1日 2回朝及び就寝前に経口投与する。年齢・症状に応じて1日 150mg を超えない範囲で適宜増減するが、増量は1週間以上の間隔をあけて1日用量として 25mg ずつ行うこと。

以 上

問い合わせ先

日医工株式会社 社長室 コーポレート・コミュニケーション部
TEL 076-442-7026