

各 位

アリピプラゾール錠 3mg/6mg/12mg 「日医工」
アリピプラゾール OD 錠 3mg/6mg/12mg/24mg 「日医工」
アリピプラゾール散 1% 「日医工」
双極性障害における躁症状の改善に対する
効能・効果および用法・用量追加のお知らせ

日医工株式会社は、アリピプラゾール錠 3mg/6mg/12mg 「日医工」、アリピプラゾール OD 錠 3mg/6mg/12mg/24mg 「日医工」 およびアリピプラゾール散 1% 「日医工」につきまして、本日7月22日、下記の通り、双極性障害における躁症状の改善に対する「効能・効果」および「用法・用量」の追加に係る承認を取得いたしましたのでお知らせいたします。

ジェネリック医薬品の普及のため、先発医薬品との「効能・効果」および「用法・用量」の違いを早期に解消し、患者様や医療関係者の皆様が安心してご使用いただけるよう取り組んでまいります。

記

【効能・効果】（下線部追加）

- ・統合失調症
- ・双極性障害における躁症状の改善

【用法・用量】（下線部追加）

- ・統合失調症

通常、成人にはアリピプラゾールとして1日6～12mgを開始用量、1日6～24mgを維持用量とし、1回又は2回に分けて経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減するが、1日量は30mgを超えないこと。

- ・双極性障害における躁症状の改善

通常、成人にはアリピプラゾールとして12～24mgを1日1回経口投与する。
なお、開始用量は24mgとし、年齢、症状により適宜増減するが、1日量は30mgを超えないこと。

以 上

問い合わせ先
日医工株式会社 社長室 コーポレート・コミュニケーション部
Tel 076-442-7026