

各 位

ピタバスタチンカルシウム錠 1mg/2mg 「日医工」  
ピタバスタチンカルシウム OD 錠 1mg/2mg 「日医工」  
小児の家族性高コレステロール血症に対する用法・用量の追加のお知らせ

日医工株式会社は、ピタバスタチンカルシウム錠 1mg/2mg 「日医工」 およびピタバスタチンカルシウム OD 錠 1mg/2mg 「日医工」 につきまして、本日 11 月 13 日、下記の通り、小児の家族性高コレステロール血症に対する「用法・用量」の追加に係る承認を取得いたしましたのでお知らせいたします。

これにより、先発医薬品と「効能・効果」および「用法・用量」が同一となります。

ジェネリック医薬品の普及のため、先発医薬品との「効能・効果」および「用法・用量」の違いを早期に解消し、患者様や医療関係者の皆様が安心してご使用いただけるよう取り組んでまいります。

記

【用法・用量】（下線部追加）

高コレステロール血症

通常、成人にはピタバスタチンカルシウムとして 1～2mg を 1 日 1 回経口投与する。  
なお、年齢、症状により適宜増減し、LDL-コレステロール値の低下が不十分な場合には増量できるが、最大投与量は 1 日 4mg までとする。

家族性高コレステロール血症

成人：通常、成人にはピタバスタチンカルシウムとして 1～2mg を 1 日 1 回経口投与する。

なお、年齢、症状により適宜増減し、LDL-コレステロール値の低下が不十分な場合には増量できるが、最大投与量は 1 日 4mg までとする。

小児：通常、10 歳以上の小児にはピタバスタチンカルシウムとして 1mg を 1 日 1 回経口投与する。

なお、症状により適宜増減し、LDL-コレステロール値の低下が不十分な場合には増量できるが、最大投与量は 1 日 2mg までとする。

以 上

問い合わせ先

日医工株式会社 社長室 コーポレート・コミュニケーション部

Tel 076-442-7026