

各位

イマチニブ錠 100mg/200mg 「日医工」
FIP1L1-PDGFR α 陽性の好酸球増多症候群又は慢性好酸球性白血病に対する
効能又は効果、用法及び用量追加のお知らせ

日医工株式会社は、イマチニブ錠 100mg/200mg 「日医工」につきまして、本日 6月 15日、下記の通り、FIP1L1-PDGFR α 陽性の好酸球増多症候群又は慢性好酸球性白血病に対する「効能又は効果」、「用法及び用量」の追加に係る承認を取得いたしましたのでお知らせいたします。

これにより、先発医薬品と「効能又は効果」、「用法及び用量」が同一となります。

ジェネリック医薬品の普及のため、先発医薬品との「効能又は効果」、「用法及び用量」の違いを早期に解消し、患者様や医療関係者の皆様が安心してご使用いただけるよう取り組んでまいります。

記

【効能又は効果】（下線部追加）

- 慢性骨髄性白血病
- KIT (CD117) 陽性消化管間質腫瘍
- フィラデルフィア染色体陽性急性リンパ性白血病
- FIP1L1-PDGFR α 陽性の下記疾患
好酸球増多症候群、慢性好酸球性白血病

【用法及び用量】（下線部追加）

- <慢性骨髄性白血病>
(略)
- <KIT (CD117) 陽性消化管間質腫瘍>
(略)
- <フィラデルフィア染色体陽性急性リンパ性白血病>
(略)
- <FIP1L1-PDGFR α 陽性の好酸球増多症候群又は慢性好酸球性白血病>
通常、成人にはイマチニブとして1日1回100mgを食後に経口投与する。
なお、患者の状態により、適宜増減するが、1日1回400mgまで増量できる。

以上